

آمپرولیوم٪ ۲۰

Amprolium 20%



ضد کوکسید یوز

فقط برای مصرف دامپزشکی

زمان پرهیز از مصرف:

۳ روز قبل از کشتار طیور مصرف دارو را قطع نمایید.

شرایط نگهداری:

دارو را در جای خشک و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دوراز نور نگهداری نمایید.

بسته بندی:

سашه ۱۰۰ و ۲۵۰ گرمی فویل آلومینیومی

گروه دارویی: ضد کوکسید یوز

شکل دارویی: پودر محلول در آب

تربیک: هر گرم از پودر حاوی ۲۰۰ میلی گرم آمپرولیوم هیدروکلراید می باشد.

مکانیسم اثر:

آمپرولیوم از لحاظ ساختمانی شباهت زیادی به تیامین دارد و به صورت رقابتی مانع از انتقال فعال تیامین در سیکل حیاتی ایمربیا شده و بر شیزوونت نسل اول کوکسیدیا ها اثر کرده و از تولید مروزونیتها، جلوگیری می کند. هم چنین باعث توقف مراحل جنسی و هاگ گذاری اووسیت ها می گردد. بیش ترین اثر آمپرولیوم در ۳ روز اول چرخه زندگی ایمربیا می باشد.

موارد مصرف:

آمپرولیوم برای پیش گیری و درمان کوکسید یوز ناشی از ایمربیا تنلا، ایمربیا آسرولینا و ایمربیا نکاتریکس در طیور گوشتی، تخم گذار و بوقامون استفاده می شود.

مقدار و روش مصرف:

محتوی سashه ۱۰۰ گرمی را در آب آشامیدنی به ترتیب ذیل به خوبی حل نموده و مصرف نمایید.

موارد عادی شیوع بیماری:

یک سashه ۱۰۰ گرمی در ۱۶۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۷-۵ روز

موارد شدید شیوع بیماری:

یک سashه ۱۰۰ گرمی در ۸۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۷-۵ روز

ادامه درمان:

یک سashه ۱۰۰ گرمی در ۳۲۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۱-۲ هفته به منظور جلوگیری از خطر عود بیماری، ادامه درمان بلافاصله پس از طی ۷-۵ روز باید انجام پذیرد.

موارد منع مصرف:

تجویز توان آن با مقادیر زیاد ویتامین ها و کنسانتره های حاوی کولین با مقادیر بالا منع شده است.

تداخلات دارویی:

این دارو نباید همراه با فورازولیدون و ویتامین B1 مصرف گردد.

عوارض جانبی:

درمان طولانی با مقادیر بالای دارو ممکن است منجر به تاخیر در رشد یا پلی نوریت (به علت کاهش قابل برگشت تیامین) شده و هم چنین سبب تاخیر در تکامل سیستم ایمنی طبیعی بدن گردد.

