



## ضد کوکسید یوز

فقط برای مصرف دامپزشکی

که کمبود ویتامین B1 در گله دیده شد، این ویتامین به جیره اضافه گردد.  
هم چنین مصرف هم‌زمان این دارو با جیره حاوی کولین منع شده است.

### عوارض جانبی:

مصرف در دوزهای بالا ممکن است موجب کمبود ویتامین B1 گردد.

### زمان پرهیز از مصرف:

۳ روز قبل از کشتار طیور مصرف دارو را قطع نمایید.

### شرایط نگهداری:

دارو را در جای خشک و دمایی کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور نگهداری نمایید.

### بسته بندی:

بسته ۵ و یک کیلوگرمی فویل آلومینیومی

**گروه دارویی:** ضد کوکسید یوز

**شکل دارویی:** پودر مخلوط در دان

**ترکیب:** هر کیلوگرم از پودر حاوی ۲۵۰ گرم آمپرولیوم هیدروکلراید و ۱۶ گرم اتوپابات می‌باشد.

### مکانیسم اثر:

آمپرولیوم از لحاظ ساختمانی شباهت زیادی به تیامین دارد و به صورت رقابتی مانع از انتقال فعال تیامین در سیکل حیاتی ایمریا شده و بر شیزونت نسل اول کوکسیدیاها اثر کرده و از تولید مروژوئیت‌ها، جلوگیری می‌کند.  
هم چنین باعث توقف مراحل جنسی و هاگ‌گذاری اووسیت‌ها می‌گردد.

بیشترین اثر آمپرولیوم در ۳ روز اول چرخه زندگی ایمریا می‌باشد. اتوپابات نیز با مهار سنتز تتراهیدروفولیک اسید تاثیری مشابه آمپرولیوم داشته و در مورد بعضی از گونه‌های ایمریا مانند E.mivati و E.maxima که نسبت به آمپرولیوم مقاوم هستند، موثر می‌باشد. مخلوط آمپرولیوم با اتوپابات موجب گستردگی طیف اثر دارو می‌گردد.

### موارد مصرف:

آمپرولیوم + اتوپابات بر روی گونه‌های مختلف ایمریا موثر بوده و برای پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز در طیور گوشتی، تخم‌گذار و بوقلمون در تمام طول دوره پرورش استفاده می‌شود.

### مقدار و روش مصرف:

این ترکیب به میزان ۵۰۰-۲۵۰ گرم در هر تن دان مصرفی اضافه می‌شود.

جوجه گوشتی: ۵۰۰ گرم در هر تن دان این میزان بطور مداوم تا ۳ روز قبل از کشتار به جیره غذایی اضافه گردد. پولت‌های تخمگذار و مادر: میزان توصیه شده بر اساس سن پرنده به قرار زیر می‌باشد: تا سن ۶ هفتگی ۴۰ گرم در هر تن دان در منطقی که احتمال وجود کوکسیدیوز وجود دارد میزان دارو در این مرحله تا ۵۰۰ گرم در هر تن دان میتواند افزایش یابد از سن ۶ تا ۱۲ هفتگی ۳۲۵ گرم در هر تن دان از سن ۱۲ تا ۱۸ هفتگی ۲۵۰ گرم در هر تن دان در نیمچه‌های مادری که مصرف غذا در آنها محدود شده باشد میزان دارو تا ۵۰۰ گرم در هر تن دان می‌تواند افزایش یابد بوقلمون ۵۰۰ گرم در هر تن خوراک این میزان باید بطور مداوم تا سن ۸ تا ۱۰ هفتگی به جیره اضافه شود.

### موارد منع مصرف:

بالا بودن میزان تیامین (ویتامین B1) جیره غذایی مانع از بروز حداکثر تاثیر این دارو می‌گردد، البته توصیه می‌شود در مواقعی

