



ویتامین

فقط برای مصرف دامپزشکی **ویسپرین C**

توجه:

محلول به صورت روزانه تهیه و حداکثر تا ۱۲ ساعت مصرف گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

دو روز پیش از کشتار، مصرف دارو باید قطع گردد.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد، دور از رطوبت و نور مستقیم خورشید قرار گیرد.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی:

ساشه ۵۰۰ گرمی و یک کیلو گرمی آلومینیوم فویل

گروه دارویی: ضد التهاب + ویتامین

شکل دارویی: پودر محلول در آب

ترکیب:

هر گرم حاوی ۲۵۰ میلی گرم آسپرین (استیل سالیسیلیک اسید) و ۲۰ میلی گرم ویتامین C می باشد.

مکانیسم اثر:

آسپرین یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی است که معمولاً با مهار واسطه های التهابی بر روی سیستم عصبی مرکزی و اثرات ضد انعقادی و تسریع گردش خون باعث کاهش درجه حرارت بدن همراه با کاهش التهاب و در نتیجه بهبود وضعیت عمومی گله شده و بواسطه آن مانع کاهش اشتها و کاهش مصرف آب و غذا می شود.

ویتامین C در زمان بروز بیماری و استرس های گوناگون با شرکت در واکنش های بیولوژیک از جمله اکسیداسیون و احیای سلولی باعث افزایش مقاومت بدن طیور جهت مقابله با عوامل بیماریزا، استرس و مسمومیت می گردد.

موارد مصرف:

در هنگام بروز بیماریهای تب دار، عفونی، باکتریایی و ویروسی، شوک گرمایی، استرسهای ناشی از واکسیناسیون و جابجایی، کنترل تب، التهاب و بی اشتهایی در گله طیور استفاده می شود.

مقدار و روش مصرف:

۵۰۰ گرم در ۵۰۰ لیتر آب آشامیدنی

تداخل دارویی:

مصرف همزمان ترکیبات حاوی استیل سالیسیلیک اسید با ضد انعقادها معمول همچون هپارین باعث افزایش خطر خونریزی بخصوص در دستگاه گوارش خواهد شد.

همچنین استیل سالیسیلیک اسید می تواند در اتصال داروها به پروتئین تداخل ایجاد کرده و باعث افزایش فرم آزاد آنها گردد.

از جمله این داروها می توان به پنی سیلین ها و سولفانامیدها اشاره کرد.

موارد منع مصرف:

مصرف همزمان ترکیبات حاوی استیل سالیسیلیک اسید با کورتیکو استروئیدها و با سایر ضد التهاب های غیر استروئیدی توصیه نمی شود.

