



ضد انگل

فقط برای مصرف دامپزشکی

کلوزا ۵۰۰

زمان پرهیز از مصرف:

شیر و گوشت ۲۸ روز پس از آخرین تجویز دارو قابل مصرف است.

شرایط نگهداری:

در مکان خشک و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری نمایید.

بسته بندی:

بلیستر ۱۰ عددی در جعبه ۵۰ عددی.

گروه دارویی: ضد انگل (ضد ترماتودها - ضد نماتودها - ضد لارو

بعضی از بند پایان)، گروه سالیسیلانیدها

شکل دارویی: بلوس خوراکی

ترکیب: هر بلوس حاوی ۵۰۰ میلی گرم کلوزانتل می باشد.

مکانیسم اثر:

کلوزانتل از طریق افزایش نفوذپذیری میتوکندری سلول انگل، به عنوان مانع (Uncoupler) فسفوریلاسیون اکسیداتیو عمل می کند.

موارد مصرف:

کلوزانتل اساسا داروی معدوم کننده کپلک در گاو و گوسفند محسوب گردیده و برای کنترل و درمان ترماتودها و نماتودهای بالغ و نابالغ گوسفند و گاو و نیز مراحل لاروی برخی بند پایان مصرف می گردد.

کلوزانتل بر علیه کرم خون خوار همونکوس کنتورتوس (Haemonchus Contortus) گوسفند موثر بوده و با نتیجه موفقیت آمیز علیه گونه هایی از این انگل که نسبت به بنزیمیدازول ها، لوامیزول و رافوکساناید مقاوم شده اند تجویز می گردد.

ضمنا دارو دارای اثراتی نیز بر کرم های نواری و بند پایان انگلی نظیر عامل گال و کنه در گوسفند و گاو می باشد.

مقدار و روش مصرف:

گوسفند:

از راه خوراکی به میزان ۱۰ mg/kg (وزن بدن) برای کنترل و درمان فاسیولاهپاتیکا و فاسیولازیگانیتیکا. به میزان ۱۵ mg/kg (وزن بدن) برای کنترل و درمان فاسیولوئید و لوسیلیاکوپرنیا. کلوزانتل بر روی Paramphistomum Fluke موثر نمی باشد.

گاو:

۵ mg به ازای هر کیلو گرم وزن بدن، برای کنترل و درمان فاسیولوزیس (هپاتیکا - ژیکانتیکا).

عوارض جانبی:

تجویز این دارو و در مقادیر توصیه شده عوارض جانبی نداشته و می توان آن را در حیوانات جوان، باردار، یا ناتوان مصرف نمود.

اطمینان از مصرف دارو:

کلوزانتل به خوبی در حیوانات تحمل می شود. مرز ایمنی آن ۶ برابر مقدار درمانی آن می باشد. هیچ گونه خطری در تولید مثل گوسفندان نر و ماده ملاحظه نشده است. اثرات تراژوژنیک و کارسینوژنیک ندارد.

