



# دیکلازوریل ۰/۵٪

## Diclazuril 0.5%

### ضد کوکسید یوز

### فقط برای مصرف دامپزشکی

### دیکلاسید

#### شرایط نگهداری:

در مکان خشک و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور نگهداری نمایید.

#### بسته بندی:

پاکت یک و ۵ کیلوگرمی فویل آلومینیومی

#### گروه دارویی: ضد کوکسید یوز سنتتیک

شکل دارویی: پرمیکس گرانوله

ترکیب: هر کیلوگرم از این ترکیب حاوی ۵ گرم دیکلازوریل خالص می باشد.

#### موارد مصرف:

این دارو با مکانیسم اختلال در ساخت دیواره اووسیت، برای پیش گیری از کوکسیدوز ناشی از گونه های مختلف ایمریا مثل: تنلا، نکاتریس، آسرولینا، برونٹی، ماکزیما، میوآتی در جوجه های گوشتی، پولت های جایگزین و بوقلمون ها مورد استفاده قرار می گیرد. هم چنین از دیکلازوریل می توان در درمان جراحات بالینی روده طیور ناشی از فعالیت ایمریا ماکزیما استفاده نمود.

#### مقدار و روش مصرف:

جوجه های گوشتی:

به میزان ۲۰۰ گرم دیکلازوریل در هر تن خوراک از یک روزگی تا ۵ روز قبل از کشتار.

پولت های جایگزین:

به میزان ۲۰۰ گرم دیکلازوریل در هر تن خوراک از یک روزگی تا ۷ روز قبل از تخم گذاری.

#### موارد منع مصرف:

از مصرف در طیور تخم گذار خودداری گردد.

#### تداخلات دارویی:

به دلیل ساختمان مشابه با تولترازوریل (با یکوکس) و به منظور جلوگیری از بروز مقاومت متقاطع در طیور از مصرف هم زمان در یک فارم خودداری گردد.

#### موارد احتیاط:

- بیش از دو دوره متوالی مصرف نشود.
- هنگام شیوع ناگهانی بیماری از دیکلاسید استفاده نشود.
- هنگام مصرف از ماسک و دستکش و... استفاده شود.

#### زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ۵ روز

#### توصیه:

جهت بروز اثرات کامل دارو بهتر است پرمیکس را ابتدا با ۵۰ - ۲۰ کیلو خوراک کاملا مخلوط نموده و سپس مخلوط حاصل با کل خوراک ترکیب گردد.

