



آنتی بیوتیک

فقط برای مصرف دامپزشکی

گروه دارویی: آنتی بیوتیک
شکل دارویی: پودر محلول در آب

ترکیب:

هر گرم پودر محصول حاوی ۵۰۰ میلی گرم داکسی سایکلین به صورت ملح هایکلید می باشد.

مکانیسم اثر:

موارد مصرف:

- بیماری CRD

- بیماری های تنفسی خصوصا بیماری ناشی از باکتری های پاستورلا، مایکوپلاسما، هموفیلوس گالیناروم، بوردتلا و کلامیدیا
- بیماری های ایجاد شده توسط باکتری های سالمونلا، اشرشیاکلی، استافیلوکوک و استرپتوکوک

مقدار و روش مصرف:

طیور:

۲۰ میلی گرم داکسی سایکلین به ازای هر کیلوگرم وزن زنده (۴ گرم داکسی سیکلین ۵۰٪ برای هر ۱۰۰ کیلوگرم وزن زنده) ۱۵ تا ۳۰ گرم داکسی سایکلین ۵۰٪ در ۱۰۰ لیتر آب به مدت ۳ تا ۵ روز

بوقلمون:

۲۰ تا ۴۰ گرم داکسی سایکلین ۵۰٪ در ۱۰۰ لیتر آب به مدت ۳ تا ۵ روز

توجه: آب آشامیدنی محتوی داروی مصرفی بهتر است ظرف ۱۲ ساعت استفاده شود.

موارد منع مصرف:

- داکسی سایکلین را نباید همراه با آنتی بیوتیک های باکتریسید مانند پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزید ها مصرف کرد.
- همراه با آنتی اسیدها، بی کربنات سدیم، کائولین، پکتین، آهن و سالیسیلات نباید مصرف کرد.
- در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد نباید مصرف شود.
- جذب داکسی سایکلین ممکن است در حضور مقدار بالای آلومینیوم، کلسیم، منیزیم، آهن کاهش یابد ولی کاهش جذب آن از سایر تتراسایکلین ها کمتر است.
- حلالیت بسته به pH آب و مواد معلق در آب متفاوت خواهد بود و آب مصرفی در تانکر فلزی نگهداری نشود.

تداخل دارویی:

- بهتر است بعد از آنتی بیوگرام مصرف شود.

موارد احتیاط:

- از مصرف طولانی مدت دارو پرهیز شود.
- اثرات آلرژیک ممکن است در مصرف طولانی مدت باعث اسهال شود.

زمان پرهیز از مصرف:

طیور: ۶ روز قبل از کشتار
بوقلمون: ۸ روز قبل از کشتار

موارد قابل توصیه:

- بهتر است بعد از آنتی بیوگرام مصرف شود.
- از مصرف طولانی مدت دارو پرهیز شود.
- اثرات آلرژیک ممکن است در مصرف طولانی مدت باعث اسهال شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی-گراد و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

ساشه های ۱۰۰ گرمی فویل آلومینیومی

