



آنتی بیوتیک

فقط برای مصرف دامپزشکی

گروه دارویی: آنتی بیوتیک
شکل دارویی: محلول خوراکی

تداخل دارویی:
مصرف همزمان انروفلوکساسین با تتراسایکلین ها و ماکرولیدها به علت احتمال بروز اثرات آنتاگونیستی توصیه نمی شود.

شرایط نگهداری:
در جای خشک، کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد، دور از تابش مستقیم نور و در ظروف دربسته نگهداری شود.

بسته بندی:
ظروف پلی اتیلنی ۱ لیتری و ۵۰ میلی لیتری

ترکیب:
هر میلی لیتر از محلول دارای ۱۰۰ میلی گرم انروفلوکساسین می باشد.

مکانیسم اثر:
انروفلوکساسین آنتی بیوتیک وسیع الطیفی است که اثر خود را با مهار آنزیم DNA gyrase و در نتیجه از بین بردن باکتری اعمال می کند. سرعت جذب خوراکی این دارو نسبتا بالاست و به سرعت در بافت های مختلف بدن انتشار می یابد.

موارد مصرف:
انروفلوکساسین برای درمان بیماری های عفونی منفرد و یا مخلوط ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی هوازی و مایکوپلاسماها در طیور نظیر CRD، کلی سیتی سمی، ویای مرغ ها، کوریزای عفونی، سالمونلوز و سایر عفونت های ناشی از باکتری های حساس به این دارو استفاده می گردد.

مقدار و روش مصرف:
به میزان ۰/۵ لیتر به ازاء هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی طیور به مدت ۳-۵ روز بنا به توصیه دامپزشک، انروفلوکساسین را می توان مستقیما به منبع آب سالن اضافه نمود. آب حاوی دارو باید طی ۲۴ ساعت مصرف شود و طی دوره مصرف، منبع آب دیگری در اختیار طیور نباشد. در مورد سالمونلوز یا پاستورلوز دوره درمانی ۵-۱۰ روز باید اعمال شود.

عوارض جانبی:
ندارد.

موارد منع مصرف:
در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

موارد احتیاط:
آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر طی ۲۴ ساعت پس از تهیه مصرف گردد.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:
۹ روز قبل از کشتار مصرف دارو باید قطع گردد.

