



آنتی بیوتیک

فقط برای مصرف دامپزشکی

انرویت

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: قرص

ترکیب:

هر قرص حاوی ۵۰ میلی گرم ماده انروفلوکساسین می باشد.

مکانیسم اثر:

انروفلوکساسین یک داروی باکتریسیدال است که علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و میکوپلاسما فعال است. این دارو اثر خود را با مهار آنزیم DNA gyrase و در نتیجه از بین بردن باکتری اعمال می کند.

موارد مصرف:

این محصول در درمان عفونت های دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی، دستگاه ادراری و تناسلی، پوست، عفونت های ثانویه و التهاب گوش خارجی در سگ بکار می رود.

مقدار و روش مصرف:

روش مصرف خوراکی می باشد.

مقدار مصرف ۵ میلی گرم انروفلوکساسین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن سگ به صورت خوراکی و یکبار در روز یا به صورت دوز منقسم دو بار در روز به مدت ۵ تا ۱۰ روز با غذا یا بدون غذا می باشد.

برای سگ های متوسط دوز روزانه ۱ قرص به ازای هر ۱۰ کیلو گرم وزن بدن می باشد.

بیش از دوز توصیه شده استفاده نگردد.

در صورت مصرف بیش از حد دارو به صورت اتفاقی، علائم استفراغ، اسهال و تغییرات رفتاری سیستم اعصاب مرکزی ممکن است رخ دهد.

توجه:

این دارو در سگ های باردار و طی دوره شیرواری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

عوارض جانبی:

ندارد.

موارد منع مصرف:

در سگ های با سن کمتر از ۱ سال یا به طور استثناء در نژادهای بزرگ سگ که دارای دوره رشد طولانی تر هستند، در سن زیر ۱۸ ماه استفاده نشود چون غضروف های مفصلی ممکن است طی دوره رشد سریع تحت تاثیر قرار بگیرد. برای پیشگیری از این دارو استفاده نشود.

موارد احتیاط:

زمان پرهیز از مصرف:

شرایط نگهداری:

در جای خشک و دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

بلیسترهای ۶ عددی در جعبه های ۳۰ عددی

