



آنتی بیوتیک

فقط برای مصرف دامپزشکی

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: پودر مخلوط در دان

ترکیب:

هر کیلوگرم پرمیکس حاوی ۸/۸ گرم لینکومایسین (ملح هیدروکلراید) می باشد.

مکانیسم اثر:

نحوه عمل لینکومایسین به این صورت است که به تحت واحد S ۵۰ ریبوزوم باکتری متصل می شود و سنتز پروتئین را مهار میکند در نتیجه تکثیر باکتری متوقف می شود. لینکومایسین علیه باکتری های گرم مثبت مانند استافیلوکوکوس، استرپتوکوکوس، کلستریدیوم، اکتینومایست گونه هایی از مایکوپلاسما موثر است.

موارد مصرف:

جهت کنترل ورم روده نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینژنس، کمک به رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی در نیمچه های گوشتی و کنترل CRD

مقدار و روش مصرف:

۵۰۰ گرم در هر تن خوراک از هفته اول پرورش جوجه های گوشتی تا انتهای دوره.

تداخل دارویی:

مصرف همزمان با اریترومایسین، تایلوزین و نوویوسین توصیه نمی شود. این محصول با کلیه کوکسیدیو استات ها و محرک های رشد سازگار می باشد.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد

شرایط نگهداری:

در جای خشک و دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

بسته های یک و پنج کیلوگرمی فویل آلومینیومی

