



## ضد انگل

فقط برای مصرف دامپزشکی

سستوفن پلاسی

**گروه دارویی:** ضد انگل

**شکل دارویی:** قرص خوراکی

**ترکیب:**

هر قرص حاوی ۵۰ میلی گرم پرازی کوانتل و ۱۴۴ میلی گرم پیرانتل پاموات و ۲۰۰ میلی گرم فنبندازول می باشد.

**موارد مصرف:**

این ترکیب ضد انگل وسیع الطیف است که علیه کرم های نواری و کرم های گرد متداول و همچنین چندین شکل نابالغ در سگ به کار می رود.

پرازی کوانتل موثرترین ترکیب علیه سستودها در این قرص است که علیه *Echinococcus granulosus* فعال است.

پیرانتل پاموات به طور موثری علیه آسکاریدهای متداول مثل *Toxocara canis* و *Toxocara leonine* و کرم های قلاب دار مثل *Ancylostoma caninum* و *Uninaria stenocephala* در سگ فعال است.

فنبندازول علیه *Trichuris* فعال است و دارای اثر سینرژیمی با پیرانتل پاموات علیه نماتودها است.

از این محصول در درمان و کنترل کرم های نواری و کرم های گرد زیر در سگ و توله سگ استفاده می شود:

**کرم های نواری:** (اشکال بالغ و نابالغ)

*Echinococcus species*, *taenia species*, *Dipylidium caninum*

**کرم های آسکاریس:** (اشکال بالغ و نابالغ)

*Toxocara canis*, *Toxasaris leonina*

**کرم های قلابدار:**

*Ancylostoma caninum*, *Uncinaria Stenocephala*

**کرم های شلاق:**

*Trichuris vulpis*

**مقدار و روش مصرف:**

یک قرص به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن  
**توله سگ و سگهای سایز کوچک:**

وزن کمتر از ۲ کیلوگرم یک چهارم قرص

وزن ۲ تا ۵ کیلوگرم نصف قرص

وزن بین ۵ تا ۱۰ کیلوگرم یک قرص

**سگهای سایز متوسط:**

وزن بین ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم ۲ قرص

وزن بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم ۳ قرص

**سگهای سایز بزرگ:**

وزن بین ۳۰ تا ۴۰ کیلوگرم ۴ قرص

وزن بین ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم ۵ قرص

فقط برای تجویز از راه خوراکی، قرص را می توان همراه با غذا خوراند و یا مستقیم داخل دهان سگ قرار داد قبل از تجویز

دارو هیچ نوع پرهیز غذایی و رژیم غذایی لازم نمی باشد. برای درمان عفونت های معمول یک بار درمان کفایت می کند اما در موردی که عفونت های شدید کرمی مطرح است حتما باید درمان را برای ۳ روز متوالی ادامه داده و در ۱۴ روز بعد تکرار کرد به دلیل اجتناب از خطر آلودگی مجدد حتما باید هر ۳ ماه درمان را تکرار کرد.

**توجه:**

مسمومیت به واسطه مصرف این محصول به دلیل تحمل بالای سگ نسبت به آن به ندرت اتفاق می افتد.

**موارد منع مصرف:**

در صورت حساسیت به هر کدام از مواد موثره یا هر کدام از مواد جانبی محصول نباید استفاده شود.

مصرف این محصول در ۴ هفته اول بارداری سگ های ماده توصیه نمی شود.

**تداخل دارویی:**

همزمان با پی پرازین، مورانتل، لوامیزول و ترکیبات ارگانو فسفره مصرف نگردد.

همچنین استفاده همزمان این دارو با سایر ترکیبات کولینرژیک می تواند منجر به مسمومیت گردد.

**شرایط نگهداری:**

در جای خشک و دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.

**بسته بندی:**

بلیسترهای ۶ عددی در جعبه های ۳۰ عددی

