



ضد کوکسید یوز

فقط برای مصرف دامپزشکی

شرایط نگهداری:

در جای خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از تابش نور مستقیم و در کیسه‌های در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود

بسته بندی:

بسته‌های ۵ کیلو گرمی و یک کیلو گرمی فویل آلومینیومی



گروه دارویی: ضد کوکسید یوز

شکل دارویی: گرانول مخلوط در دان (پریمیکس)

ترکیب:

هر گرم از پودر حاوی ۶۶ میلی گرم روبنیدین هیدروکلراید می باشد.

مکانیسم اثر:

روبنیدین یک کوکسیدیواستات شیمیایی که برخلاف یونوفوره‌ها در دومرحله از چرخه زندگی وبا مهار تقسیم هسته انگل ایمریا تاثیر خود را میگذارد و علیه گونه‌های مختلف ایمریای بیماریزا در طیور گوشتی شامل ایمریا نکاتریکس، ایمریا اسرولینا، ایمریا ماکزیما و ایمریای پاتوژن بوقلمون بسیار موثر است. روبنیدین یک ضد کوکسید یوز ایده‌آل در برنامه clean up و به منظور پیشگیری و کنترل کوکسید یوز بخصوص در زمان آلودگی شدید می باشد.

روبنیدین در مقایسه با یونوفوره‌ها کاهش شدید دفع اووسیت را در مدفوع باعث می‌شود وبا سایر ضد کوکسید یوزها مقاومت متقاطع ندارد. با ممانعت از ایجاد ضایعه در دیواره اپیتلیوم روده علاوه بر افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل غذایی مانع عفونت ثانویه توسط کلستریدیوم پرفرنزنز (عامل اصلی انتریت نکروتیک) می‌شود. همچنین بافت اپیتلیوم سالم روده‌ای شرایط دریافت بالاترین میزان بازدهی غذایی را فراهم می‌آورد که منجر به رشد سریعتر و کاهش ضریب تبدیل غذایی می‌شود.

موارد مصرف:

در طیور گوشتی و بوقلمون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقدار و روش مصرف:

۵۰۰ گرم در هر تن خوراک

جهت به دست آوردن مخلوط یکنواخت با خوراک، ابتدا میزان مورد نیاز را در ۱۰ کیلوگرم خوراک و سپس به ترتیب در ۱۰۰ و ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک مخلوط نمایید.

موارد منع مصرف:

ندارد.

عوارض جانبی:

ندارد.

زمان پرهیز از مصرف:

۵ روز قبل از کشتار مصرف آن قطع گردد.

از مصرف دارو در طیور تخمگذاری که تولید آنها مصرف انسانی دارد، پرهیز گردد.