



آنتی بیوتیک

فقط برای مصرف دامپزشکی

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: محلول خوراکی

ترکیب:

هر میلی لیتر از محلول حاوی:

سولفا دی متوکسین ۲۰۰ میلی گرم

تری متوپریم ۴۰ میلی گرم

تداخل دارویی:

این دارو نباید همزمان با داروهای پلی پتیدی، بتالاکتام و آمینو گلیکوزیدها تجویز گردد.

شرایط نگهداری:

در ظروف دربسته، در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد) و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

ظروف پلی اتیلنی ۱ لیتری و ۵۰ میلی لیتری

مکانیسم اثر:

سولفادی متوکسین از تبدیل اسید پارا آمینومنزوتیک به اسید دی هیدروفولیک جلوگیری کرده و تری متوپریم از احیای اسید دی هیدروفولیک در روند ساخت اسیدهای نوکلئیک جلوگیری به عمل می آورد. این دو ماده با اثر سینوژنیزم بر یکدیگر باعث مهار ساخت DNA در هسته باکتری شده و دارای خاصیت باکتریسیدی می باشند.

موارد مصرف:

این دارو جهت درمان بیماری های ناشی از عوامل باکتریایی حساس به ترکیب سولفانامید-تری متوپریم مانند مایکوپلاسماوز (CRD)، کلی باسیلوز، کریزای عفونی، پنومونی های باکتریایی و اسهال های عفونی در طیور (گوشتی و مادر)، استفاده می شود.

مقدار و روش مصرف:

۵۰۰ میلی لیتر محلول در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی، به مدت ۳ الی ۵ روز متوالی.

عوارض جانبی:

ندارد.

موارد منع مصرف:

در حیوانات حساس به سولفونامیدها استفاده نشود. در طیور تخمگذار استفاده نشود.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود. از تماس مستقیم با پوست و استنشاق دارو خودداری گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت و احشاء: ۵ روز

