



آنتی بیوتیک

فقط برای مصرف دامپزشکی

هر کیلوگرم وزن بدن را دریافت کردند در مدت ۱۳ هفته هیچ علائمی از سمیت را نشان ندادند.

شرایط نگهداری:

در دمای اتاق کنترل شده (۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی-گراد) نگهداری نمایید.

بسته بندی:

بلیسترهای ۶ عددی در جعبه های ۶ عددی

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: قرص

ترکیب دارو:

هر قرص حاوی ۲۵۰ میلی گرم سولفادی متوکسین می باشد.

مکانیسم اثر:

سولفادی متوکسین خاصیت باکتریواستاتیک دارد و از تبدیل اسید پارا آمینوبنزواتیک به اسید دی هیدروپولیک در باکتری جلوگیری می کند.

موارد مصرف:

برای درمان عفونت های تنفسی و ادراری - تناسلی و روده ای و بافت های نرم در سگ و گربه بکار می رود. بیماری های زیر توسط ارگانسیم های حساس به سولفادی متوکسین نظیر استرپتوکوک، استافیلوکوک اشیشیالی، سالمونلا، کلبسیلا، پروتئوس و شیگلا ایجاد می شوند: التهاب لوزه ها، التهاب حلق، برونشیت، پنومونی، التهاب مثانه، التهاب کلیه، متریت، پیومتر، درماتیت پوستولر، عفونت کیسه مقعدی، آبسه ها، عفونت های ناشی از زخم، التهاب روده ای باکتریایی، سالمونلوز، کوکسیدیوز

مقدار و روش مصرف:

مصرف به صورت خوراکی می باشد.

دوز روز اول ۵۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حیوان یا ۱ قرص به ازای هر ۴/۵ کیلوگرم وزن بدن حیوان می باشد. دوز روزهای بعدی ۲۷/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حیوان یا نصف قرص به ازای هر ۴/۵ کیلوگرم وزن بدن حیوان می باشد.

مدت درمان بسته به پاسخ درمانی است و در اکثر موارد درمان بین ۳ تا ۵ روز می باشد.

درمان تا زمانی که حیوان به مدت ۴۸ ساعت بدون علائم باشد باید ادامه یابد.

موارد احتیاط:

طی دوره درمان مطمئن شوید که حیوان به قدر کافی آب مصرف کند.

سمیت و ایمنیت دارو:

اطلاعات مربوط به سمیت حاد و مزمن سولفادی متوکسین نشان می دهد که این دارو خیلی ایمن است.

در سگ هایی که تک دوز خوراکی ۳/۲ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن را دریافت کردند تنها عارضه جانبی بود که دیده شد.

همچنین در سگ هایی که دوز خوراکی ۱۶۰ میلی گرم به ازای

