



ضد کوکسید یوز

فقط برای مصرف دامپزشکی

دیاکینوکوکس

گروه دارویی: ضد کوکسید یوز

شکل دارویی: محلول خوراکی

ترکیب:

هر لیتر از محلول خوراکی سولفاکینوکسالین + دیاوریدین حاوی مواد زیر می باشد:  
سولفاکینوکسالین ۲۵/۶ گرم  
دیاوریدین ۶/۴ گرم

مکانیسم اثر:

سولفاکینوکسالین از دسته سولفانامیدها بوده و از طریق دخالت در تولید اسید فولیک باعث توقف متابولیسم و اختلال در سنتز پروتئین ها می شود. دیاوریدین از دسته داروهای متوقف کننده DHFR (dihydrofolate reductase) می باشد. مصرف توام سولفاکینوکسالین و دیاوریدین طیف اثر ضد میکروبی و ضد تک یاخته ای این دارو را افزایش می دهد.

موارد مصرف:

استفاده از این دارو در موارد زیر توصیه میشود:  
درمان کوکسیدیوز ناشی از ایمریاتنلا، ایمریا آسرولینا، ایمریا ماکسیما، ایمریا نکاتریس و نیز اسهال های ناشی از آنها، کنترل مرگ و میر ناشی از وبای طیور ناشی از پاستورلا مولتی سیدا، کاهش میزان شیوع تیفوئید ناشی از سالمونلا گالیناروم در بوقلمونها، جلوگیری از تلفات جنینی و کاهش قدرت جوجه درآوری در مواقع تهدید خطر کوکسیدیوز در گله های مادر

مقدار و روش مصرف:

طیور:

۳ میلی لیتر از دارو در یک لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ روز در اختیار طیور قرار داده سپس درمان را به مدت ۲ روز قطع نموده و مجدداً ۳ روز ادامه دهید. (۳ روز درمان - ۲ روز فاصله - ۳ روز درمان)

موارد منع مصرف:

در طیور تخم گذاری که تخم آنها به مصرف انسان می رسد، نباید مصرف شود.

زمان پرهیز از مصرف:

در پولتهای تخم گذار درمان باید ۲۸ روز پیش از تخمگذاری قطع گردد. زمان پرهیز از مصرف گوشت برای مرغ ۵ روز می باشد.

شرایط نگهداری دارو:

دور از نور و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

