



ضد کوکسیدیوز

فقط برای مصرف دامپزشکی

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی:

ظرف پلی اتیلنی یک لیتری

گروه دارویی: ضد کوکسیدیوز

ترکیب: هر میلی لیتر از محلول خوراکی حاوی ۲۵ میلی گرم تولترازوریل می باشد.

گونه هدف: طیور (گوشتی و مرغ مادر) و بوقلمون

مکانیسم اثر:

تولترازوریل در تقسیم هسته و فعالیت میتوکندری انگل دخالت کرده و باعث کاهش آنزیم های زنجیره تنفسی انگل و نهایتاً مرگ انگل می گردد.

موارد مصرف:

تولترازوریل یک آنتی کوکسیدیال وسیع الطیف است که برای درمان کوکسیدیوز علیه آیمریاهای مولد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی و مرغ مادر مانند ایمریا آسروولینا، ایمریا برونٹی، ایمریا ماکسیمما، ایمریا میتیس، ایمریا نکاتریکس و ایمریا تنلا و گونه های ایمریا آدنوئیدس، مله آگریمیتیس و مله آگریدیس در بوقلمون ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و روش مصرف:

۷ میلی گرم تولترازوریل به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، معادل یک لیتر محلول خوراکی تولترازوریل ۲/۵٪ در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی (۲۵ پی پی ام) به مدت ۲ روز متوالی و یا ۳ لیتر محصول در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی (۷۵ پی پی ام) برای ۸ ساعت در هر روز به مدت ۲ روز متوالی.

توجه:

مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف:

مصرف تولترازوریل ۲/۵٪ در طیور تخمگذاری که تخم آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است.

تداخلات دارویی: ندارد.

زمان پرهیز از مصرف:

مصرف دارو باید ۱۶ روز قبل از کشتار قطع گردد.

موارد احتیاط:

- پس از باز شدن درب بطری، محتویات محتویات در طول مدت ۶۰ روز باید مصرف گردد.
- محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا ۲۴ ساعت باید مصرف شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

