



ضد انگل

فقط برای مصرف دامپزشکی

گروه دارویی: ضد انگل

شکل دارویی: بلوس ۲۵۰ میلی گرمی

ترکیب: هر بلوس حاوی ۲۵۰ میلی گرم تریکلابندازول می باشد.

مکانیسم اثر:

تریکلابندازول جزء گروه بنزامیدازول ها می باشد و فعالیت آنزیم فومارات ردوکتاز را بدون اینکه تاثیر نامطلوبی در میزبان داشته باشد در انگل مهار می کند.

تریکلابندازول بر چرخه انگل از مرحله نابالغ تا بلوغ کامل موثر است.

موارد مصرف:

برای درمان فاسیولوزیس حاد، تحت حاد و مزمن توصیه می شود.

روش مصرف:

معمولا بلوس تریکلابندازول را از طریق خوراکی به کمک بلوس خوران و یا خرد کردن بلوس و افزودن کمی آب به آن مصرف می نمایند. دارو در فاسیولوزیس حاد و تحت حاد و مزمن گاو، گوسفند و بز به خوبی موثر می باشد.

مقدار مصرف:

گوسفند و بز:

۱۰ mg/kg وزن بدن (یک بلوس ۲۵۰ میلی گرمی به ازای هر ۲۵ کیلوگرم وزن دام).

گاو و اسب:

۱۲ mg/kg وزن بدن (۲ بلوس ۲۵۰ میلی گرمی به ازای هر ۴۰ کیلوگرم وزن دام).

حداکثر میزان مصرف آن در گوسفند ۲۰۰ mg/kg (۲۰ برابر دوز درمانی دارو) می باشد، ولی در این مورد برای بز و گاو گزارش معتبری منتشر نشده است.

ضمنا تریکلابندازول را می توان به حیوانات آبستن، تحت استرس و جوان نیز تجویز نمود.

موارد منع مصرف:

تا ۷ روز پس از زایمان دام از مصرف آن خودداری نمایید. این دارو بر نماتودها و دیکروسیلیوم تاثیری ندارد.

موارد احتیاط:

- هنگام آلودگی حاد تمام گله را به طور هم زمان باید درمان نمود.
- پس از تجویز دارو دست ها را با آب و صابون شستشو دهید.
- دارو برای آبزیان سمی است، لذا دارو نباید وارد آب های جاری، آب های رودخانه و یا سدها گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

شیر: ۷ روز پس از آخرین مصرف دارو

گوشت: ۲۸ روز پس از آخرین مصرف دارو

شرایط نگهداری:

در مکان خشک و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری نمایید.

بسته بندی:

بلیستر ۱۰ عددی در جعبه های ۵۰ عددی.

