



## ضد کوکسید یوز

فقط برای مصرف دامپزشکی

**گروه دارویی:** کوکسیدیواستات (یونوفوره)

**شکل دارویی:** پریمیکس

**ترکیب:**

هر کیلوگرم پریمیکس حاوی ۱۰ گرم مادورامایسین آمونیوم می باشد.

### مکانیسم اثر:

این محصول یک کوکسیدیواستات یونوفوره و مونووالان می باشد که با تغییر نفوذپذیری غشا تک یاخته نسبت به کاتیون‌های سدیم و پتاسیوم باعث افزایش فشار اسمزی داخل سلول شده و در نتیجه اعمال میتوکندری متوقف گردیده و با هیدرولیز ATP موجب اختلال در متابولیسم انگل و مرگ آیمیریا می گردد.

### موارد مصرف:

مادورامایسین در پیشگیری از کوکسیدیوز در جوجه‌های گوشتی استفاده می شود. این دارو روی آیمریاهای مختلف مانند نکاتریکس، آسرولینا، میواتی، ماکسیما، تنلا و برونٹی موثر است.

### مقدار و روش مصرف:

جوجه‌های گوشتی: ۵ ppm به طور مداوم در غذا به این منظور ۵۰۰ گرم پریمیکس مادورامایسین به یک تن غذا اضافه می شود. مخلوط کردن باید به طور یکنواخت انجام شود. ابتدا ۵۰۰ گرم پریمیکس به ۵ کیلوگرم دان افزوده شده، سپس با ۵۰ کیلوگرم دان مخلوط شده در نهایت به یک تن دان اضافه و کاملاً یکنواخت شود.

### زمان پرهیز از مصرف:

حداقل ۵ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.

### موارد منع مصرف:

این دارو فقط در جوجه‌های گوشتی مصرف می شود و نباید در سایر طیور و پرندگان استفاده گردد. این دارو همراه با کوکسیدیواستات‌ها مصرف نشود. مصرف هم زمان این دارو با تیمولین هیچ گونه عوارض جانبی ندارد.

### شرایط نگهداری:

پس از مصرف در پاکت را کاملاً بسته در جای خشک و دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.

### بسته بندی:

بسته های ۱ و ۵ کیلوگرمی در فویل آلومینیومی