



ضد انگل

فقط برای مصرف دامپزشکی

گروه دارویی: ضد انگل

شکل دارویی: محلول خوراکی

ترکیب:

هر میلی لیتر از محلول خوراکی حاوی ۲ میلی گرم آیورمکتین می باشد.

شرایط نگهداری:

در ظروف در بسته، دور از نور مستقیم و در دمای اتاق (زیر ۳۰ درجه سانتی گراد) نگهداری شود و از یخ زدگی اجتناب شود.

بسته بندی:

ظروف پلی اتیلنی یک لیتری و ۲۵۰ و ۵۰ میلی لیتری

مکانیسم اثر:

آیورمکتین آزاد شدن ناقل عصبی گابا (نوروترنسمیتر مهاری) را در نورون های پیش سیناپسی افزایش می دهد گابا، تحریک پس سیناپسی نورون های مجاور را در نماتودها و فیبرهای عضلانی بندپایان متوقف می کند و سبب فلجی و مرگ انگل می شود.

موارد مصرف:

از این محصول میتوان جهت کنترل و درمان انگل های داخلی شامل کرمهای گرد بالغ و ۴ L دستگاه گوارش و کرمهای گرد بالغ ۴ L دستگاه تنفس و همچنین علیه انگل های خارجی شامل شپش ها، جرب و لارو مگس و کرم بینی استفاده کرد.

مقدار و روش مصرف:

مقدار ۱ میلی لیتر از محلول آیورمکتین ۰.۲٪ به ازاء ۱۰ کیلوگرم وزن زنده دام، استفاده می شود.

این دارو در دوز توصیه شده حاشیه امنیت بالایی دارد و در میش های آبستن در هر مرحله از آبستنی قابل مصرف است.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت:

۱۱ روز پس از آخرین درمان.

شیر:

۲۸ روز پس از آخرین درمان.

موارد احتیاط:

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

از سیگار کشیدن، خوردن و آشامیدن حین کار با دارو خودداری شود.

از تماس دست های آلوده به دارو با چشم خودداری شود.

در صورت آغشته شدن دست ها با دارو بلافاصله با مقدار کافی آب و صابون شسته شود.

پس از باز شدن درب بطری محتویات در طی مدت ۳۰ روز باید مصرف شود.

موارد منع مصرف:

در کره اسب های زیر ۴ ماه و در دام های شیروار استفاده نگردد.

