



نیکارباژین ۸٪ + مونسنین سدیم ۸٪

Nicarmon

ضد کوکسید یوز

فقط برای مصرف دامپزشکی

نیکارمون

عوارض جانبی: ندارد.

هشدار:

این محصول در اسب استفاده نشود. طیوری که دان حاوی این محصول را دریافت می‌کنند حداقل هفت روز قبل یا بعد از آن نباید با تیمولین درمان شده باشند. در زمان مخلوط کردن محصول با دان از تماس مستقیم با پوست یا غشاءهای مخاطی اجتناب شود و از وسایل محافظتی مثل لباس کار مناسب عینک محافظ ماسک دستکش‌های غیر قابل نفوذ استفاده شود.

شرایط نگهداری:

در بسته‌های اصلی و در بسته و در جای خشک و دارای تهویه مناسب و دور از نور مستقیم نگهداری شود.

بسته بندی:

بسته‌های یک کیلوگرمی

گروه دارویی: ضد کوکسید یوز

شکل دارویی: پودر مخلوط در دان (پریمیکس)

ترکیب: هر ۱۰۰ گرم از محصول حاوی ۸ گرم مونسنین سدیم و ۸ گرم نیکارباژین می باشد.

مکانیسم اثر:

ترکیب نیکارباژین به عنوان یک داروی آنتی کوکسیدیلال شیمیایی و مونسنین به عنوان یک آنتی کوکسیدیلال یونوفوره، ترکیبی سینرژیک به وجود آورده که در پیشگیری و کنترل کوکسید یوز مورد استفاده قرار می گیرد. در سطح سلولی اثر این دارو برای مهار توسعه اسپرووزوئیت‌ها و تروفوزوئیت‌ها می باشد.

موارد مصرف:

برای کنترل کوکسید یوز در جوجه‌های گوشتی، پولتهای جایگزین و بوقلمون استفاده می شود که توسط گونه‌های مختلف آیمیریا شامل *Eimeria E.tenella*, *E.acervulina*, *E.maxima*, *E.necatrix*, *E.brunetti*, *E.mitis*, *E.praecoc*, *E.meleagrimitis*, در جوجه‌های گوشتی و گونه‌های *E.adenooids*, *E.gallopavonis*, *E.meleagridis*, *E.dispersa* در بوقلمون ایجاد می شوند.

مقدار و روش مصرف:

روش مصرف خوراکی می باشد. محصول باید به طور یکنواخت با دان مخلوط گردد. برای پیشگیری از کوکسید یوز در جوجه‌های گوشتی و بوقلمون محصول اغلب در غلظت ۴۰/۴۰ پی پی ام استفاده می شود که این غلظت از مخلوط کردن ۵۰۰ گرم از محصول در یک تن دان بدست می آید. در صورت آلودگی شدید می توان از غلظت ۵۰/۵۰ پی پی ام یا ۶۲۵ گرم محصول در یک تن دان استفاده کرد. میکروگرانول‌های محصول باید با سایر اجزاء دان به خوبی مخلوط شود تا یک مخلوط همگن و یکنواخت بدست آید. تجهیزات و وسایل مربوط به اختلاط و انتقال باید به خوبی تمیز شوند.

زمان پرهیز از مصرف:

در نیمچه‌های گوشتی ۳ روز قبل از کشتار باید دارو مصرف نشود و در پولت‌های تخمگذار و بوقلمون از ۱۶ هفتهگی به بعد مصرف نشود.

موارد منع مصرف:

در طیور تخمگذار استفاده نشود. با سایر ضد کوکسید یوزها مخلوط نگردد.

