



گروه دارویی: مکمل درمانی

شکل دارویی: محلول خوراکی

گونه هدف: طیور و بوقلمون

ترکیب دارو:

هر میلی لیتر از محلول خوراکی حاوی :

سوربیتول مایع:	۱۷۵	میلی گرم
منیزیوم (سولفات):	۱۰	میلی گرم
پتاسیم (کلراید):	۱۷	میلی گرم
آرتیشو:	۱۵	میلی گرم

مکانیسم اثر:

سوربیتول: یک الکل قندی است که به عنوان یک دیورتیک اسمزی عمل می کند و با افزایش حجم ادرار به دفع سموم و مواد زائد از طریق ادرار کمک می کند و احتمال تشکیل سنگ های کلیوی را کاهش می دهد.

پتاسیم کلراید: به حفظ تعادل الکترولیت ها در بدن کمک می کند و با تنظیم تعادل اسید-باز عملکرد کلیه را بهبود می بخشد.

سولفات منیزیوم: با افزایش فشار اسمزی در لوله های کلیوی باعث دفع آب و الکترولیت ها می شود.

آرتیشو: حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی مانند سینارین و اسید کلروژنیک می باشد که از آسیب اکسیداتیو به سلول های کلیوی جلوگیری میکند همچنین با افزایش حجم ادرار به دفع مواد زائد از کلیه کمک می کند.

موارد مصرف:

- اختلالات سیستم ادراری ، سنگ های کلیوی
- عفونت های کلیوی
- درگیری کلیه در برونشیت عفونی
- مسمومیت های دارویی
- مایکوتوکسیکوز
- بعد از مصرف آنتی بیوتیک ها خصوصاً سولفونامیدها
- در مواردی که آب فارم حاوی نمک و املاح بالا می باشد
- در طیور گوشتی زمانی که جیره آنها حاوی پروتئین بالا می باشد. (خصوصاً ۲ هفته اول پرورش)

مقدار و روش مصرف:

• در موارد حاد: ۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی

• در موارد غیر حاد: ۵/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد

شرایط نگهداری: در جای خشک و در دمای ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود.

بسته بندی: ظرف پلی اتیلنی ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی لیتری

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت ۶۰ روز باید مصرف گردد.

